Tressot noir

Vass8R01s111-115

Vass8R01s111-115

Collection Vassal-Montpellier

Juntumburn

0Mtp1139

dantadantadantadantad

Tressot novi

*Tressot novi

Cl8 R1 s111-115

en herbin rayelle Lindt ??) + der hur
ou plantet Bedan 0262) + der hur







ni

ANNEE 1988 NOM Tressot u

humana

EMPLACEMENT 8 R1 s 111. 115

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturité	
1 2 3	finille											
4 5	23		25.3 25.3	0	0		1				- Andrew Control of the Control of t	

ANNEE 1989

NOM Tresset nour

Pourriture :

EMPLACEMENT 8 RAS MAS 115

Port: mi lugi Vigueur: 2,5 faible a'may

ni

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 3 4 5	3	13.3	203 · 16.3 · 16.3 ·	0	5,0	14 S	18.5	24.5	17,7	24 * +1	31,7	20.8
Pourriture: 0 Mill.: 1 Port: mu'enge' Vigueur: 3,5												

NOM Tressot in EMPLACEMENT & R1 stll. MS

hutuduntindunadunadunadu

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f		Vé début	raiso mi/v	fin	Maturité
3 %	3 4	1.3 1.3 & 5.3	123 x 5-3 x 5-3 x 5-3.	5	7	.16,5	185	215		3:7	16.7	7.890
Pourriture: 0 Mill.: 10% Port: Vigueur:												

nhortunhortunhortunhortunh

duntumburtumburtumburtumb

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

luntantanti

Tressot non 8 R 1 s. 111-115 (2.113)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalens - en gouttjere - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubercante 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 201 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 203 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entlèrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, La couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - édveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 280.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villesité pubescente 284 - sans villesité laineuse (285).

A limbe Clan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole ghabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

No d'ordre : Désignation :

Juntanianta

Tressot moin 8 R 1 s. 111-115 (113)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotolé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241, sans villosité pubescente (88) - sans villosité laineuse (289) Entlerement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies (249) - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253)

: <u>dos</u> coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte (260) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

tres courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 255. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calaro 86

Tressot non

N° d'ordre : Désignation :

hintimlimiti

8 R 1 s. 111-115 (1-43)

<u>dontanlantanlantanlantanl</u>

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne (4) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 200

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux (515 duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 271 - sans villosité laineuse

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée (6) - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -

plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte (6) - point pétiolaire rouge 164 -

partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 d'élabire entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (71) - court 172.

Glabre (73) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré (7) - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

-Calvo 87

Trestot mon

N° d'ordre:

Résignation:

8 R 1s - 111-115(s, 1)

Emplacement:

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (0) (dimensions 11 x).

Lache (1) - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (6).

A pédoncule herbacé (7) mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première

<u>Juntualantaalaataalaataal</u>

ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1)

huntantanti

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne (34) - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 15 x14). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93) - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde (97) - ovoïde 98 troncovoïde 99 - abovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A pus incolore 105 - coloré 106. a ombilic tres apparent - peu apparent. a section transversale : régulière (07) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (1). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbocée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pedicelle long 119 - moyen 120 - court 2. A pédicelle de couleur : verte 122) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (29 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (29). A pinceau : court 130 - moyen (3) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (34) A peau fine (3) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (3) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 91

Tressot moir 8 R1 A MM. M5 + 5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

huntumlanti

SARMENT DE VIGNE

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

<u>Amatan landarahan kan landarah</u>

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 42..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo86

N° d'ordre : Désignation : Tressot M Emplacement: 8 RA & MM. MS Angle des nervures Sexe L1/L2

lunturdunti

L2/L : 10 - 11Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

: 4 - 5 - 6 : 7 - 8 - 9

: (10)-(11)

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - 41 Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures L₃ L'₃ : (60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - (64) - 65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction: vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90